



(12)

## CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2013 00083**

(22) Data de depozit: **24.01.2013**

(41) Data publicării cererii:  
**29.08.2014** BOPI nr. **8/2014**

(71) Solicitant:  
• UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE"  
DIN SUCEAVA, STR. UNIVERSITĂȚII NR.13,  
SUCEAVA, SV, RO

(72) Inventatori:  
• DUDUMAN MIHAI LEONARD,  
STR. 6 NOIEMBRIE NR. 42, BL. A1, SC. A,  
AP. 4, SUCEAVA, SV, RO;  
• VASIAN IULIANA, STR. NOUA NR. 302,  
BACIU, CJ, RO

### (54) NADĂ SINTETICĂ PENTRU GÂNDACUL DE SCOARȚĂ AL MOLIDULUI, IPS DUPLICATUS L.

(57) Rezumat:

Invenția se referă la o nadă sintetică, destinată atragerii gândacilor de scoarță *Ips duplicatus*. Nada conform invenției este formată dintr-un plic (1) din folie de polietilenă având o grosime a foliei de 50 µ și dimensiuni interne de 50x70 mm, închis prin niște suduri (2) termice, în interior fiind un material (3) celulozic impregnat cu un amestec de substanțe volatile, protejat la oxidare.

Revendicări: 1

Figuri: 1





Fig. 1a

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).





## NADĂ SINTETICĂ PENTRU GÂNDACUL DE SCOARȚĂ AL MOLIDULUI, *IPS DUPLICATUS* L.

Invenția se referă la o nadă sintetică destinată atragerii gândacilor de scoarță *Ips duplicatus* în capcane specifice (Intercept®, Theyshon®, etc.), - capcane omologate ce sunt folosite în mod curent și pentru capturarea altor specii de insecte în cadrul lucrărilor de protecția pădurii din domeniul silvic.

*Ips duplicatus* este un important dăunător al molidului, considerat invaziv în Europa Centrală și de Sud Est, care produce pagube semnificative arboretelor cu molid situate la altitudini mai mici de 800 m, pagube ce constau în uscarea arborilor pe suprafețe importante (DAISIE, 2009: Handbook of Alien Species in Europe. Springer, Dordrecht, 399 p.; EPPO/CABI: Quarantine pests for Europe. 2nd Edition. Smith, I.M., McNamara, D.G., Scott, P.R., Holderness, M. (Eds.). CAB International, Wallingford, UK, 1996, 1425 p.).

Monitorizarea populațiilor acestei specii de insectă dăunătoare este esențială în activitatea de gestionare a tipurilor de păduri în care predomină molidul. Astfel, ca și în cazul altor specii de gândaci de scoarță, pentru *Ips duplicatus* monitorizarea populațiilor se face prin două metode:

- observarea directă și inventarierea a arborilor atacați, cu stabilirea complexului de specii de insecte ce a produs atacul;
- metoda chimo-ecologică, de atragere a insectelor de interes la capcane amorsate cu diferite tipuri de nade feromonale caracteristice pentru fiecare specie de dăunători.

Metodele enumerate anterior prezintă avantaje și dezavantaje specifice. Prima metodă are avantajul că este foarte precisă, însă prezintă dezavantaje date de obligativitatea utilizării de personal specializat care trebuie să verifice arboretele cu risc de atac la intervale regulate de timp, adesea productivitatea semnalărilor atacurilor fiind redusă, limitând astfel semnificativ aria de aplicare. Cea de-a doua metodă are avantajul că este productivă, fiind aplicabilă pe scară largă pentru diferite specii de insecte dăunătoare, fără a necesita personal special pregătit. Ca și dezavantaj, până în prezent această metodă nu a putut fi folosită corespunzător pentru depistarea și monitorizarea gândacilor de scoarță *Ips duplicatus*, deoarece nadele specifice utilizate (ID-Ecolure – Slovacia și Dupliwit – Austria) s-au dovedit ineficiente pentru populațiile de *Ips duplicatus* din România.

Problema tehnică rezolvată de invenție constă în realizarea unei nade feromonale specifice pentru populațiile de *Ips duplicatus* din România, care să fie folosită în procesul de depistare și monitorizare a acestui dăunător în condiții optime.

Nada sintetică are la bază un amestec specific de substanțe chimice volatile care are rolul de a atrage olfactiv adulții de *Ips duplicatus*, amestec ce este înmagazinat într-un dispozitiv care îi asigură difuzarea constantă în funcție de temperatura mediului înconjurător, dispozitiv denumit în continuare dispenser.

Dispenserul nadei sintetice constă într-un plic închis din folie de polietilenă de densitate joasă, cu grosimea de 50 µm, cu dimensiunile interne de 50 x 70 mm,

plic în care se găsește un material celulozic absorbant cu dimensiunile de 40 x 50 x 3 mm, ce are rolul de a înmagazina soluția atractantă specifică.

Această soluție este formată dintr-un amestec de componente chimice sintetice ce imită componentele feromonale naturale ale lui *Ips duplicatus* cât și cele kairomonale caracteristice arborilor de molid atacați, la care se adaugă un solvent și un antioxidant.

Componentele feromonale au rolul de a atrage de la distanță lungă insectele spre capcană, ele imitând miresmele feromonale naturale emanate de alți adulți de *Ips duplicatus* ce au identificat un arbore favorabil colonizării, iar cele kairomonale au rolul de a direcționa insectele pe distanță scurtă spre capcană, ele imitând prin concentrația și spectrul eliberat, miresmele caracteristice unui arbore de molid debilitat, incapabil de a reacționa la atacul gândacilor de scoarță.

Astfel, amestecul atractiv sintetic este alcătuit din componente feromonale sintetice ipsdienol racemic (2-methyl-6-methylene-2,7-octadien-4-ol) și E-mircenol ((E)-2-methyl-6-methylene-2,7-octadien-1-ol), componente kairomonale sintetice (-)-alfa-pinene ((1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclohept-2-ene) și (+)-limonen ((R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene) și componenta suport (solvent) a amestecului: metilbutenol (2-Methyl-3-butene-2-ol). La acest amestec se adaugă antioxidantul BHT (butylated hydroxytoluene).

Raportul dintre componente amestecului atractiv pentru *Ips duplicatus* este:

1 Ipsdienol : 1 E-mircenol : 17 Metilbutenol : 0,5 (-)-alfa-pinene : 0,5 (+)-limonen

Antioxidantul BHT se folosește în cantitate de 2,5 g sare BHT pentru 100 ml amestec atractiv.

Amestecul de atracanți este eliberat de dispenser prin porii foliei de polietilenă, cu o rată de 20 mg/z (20°C, 50% RH).

Cantitatea de amestec atractiv utilizată pentru o nadă este de 3,0 ml. Durata de funcționare a atracantului în teren este de 6-8 săptămâni, depinzând direct de mersul vremii.

Prin aplicarea invenției se obțin următoarele avantaje:

- se realizează o nadă specifică eficientă ca și atraktivitate și cu costuri reduse ce va putea fi utilizată pentru monitorizarea populațiilor de *Ips duplicatus* din România;
- utilizarea nadei este simplă și nu presupune personal specializat;
- prin folosirea acestei nade în activitățile specifice de protecția pădurilor, se va obține o evaluare corectă a prezenței și mărimei populațiilor gândacului de scoarță al molidului *Ips duplicatus*.

Se dă în continuare un exemplu de realizarea invenției în legătură cu Fig.1- Vederea din față (a), Secțiunea verticală (b), Secțiunea orizontală (c) a nadei sintetice pentru *Ips duplicatus*

Dispenserul nadei sintetice pentru *Ips duplicatus* este format dintr-un plic 1 de polietilenă LD cu grosimea foliei de 50 µm, ermetizat prin sudurile 2 termice, în care este introdus un material 3 celulozic absorbant cu rolul de a înmagazina

amestecul atracțant alcătuit din substanțele volatile ipsdienol, e-mircenol, metilbutenol, alfa-pinol și limonen.

#### Modul de acționare a nadei:

Nada feromonală se montează în zona centrală a capcanelor specifice pentru capturarea gândacilor de scoarță (Intercept®, Theyshon®, etc.). Aceasta eliberează cantități de amestec atracțant ce variază în funcție de temperatura mediului ambiant. Substanțele volatile odată eliberate în atmosferă sunt identificate de adulții de *Ips duplicatus* aflați în zbor, care sunt astfel atrași spre capcana în care vor fi capturați.

Capcanele astfel amorsate cu nade se amplasează la minim 12 m distanță față de liziera pădurii atacate de gândacii de scoarță *Ips duplicatus*, niciodată acestea neinstalându-se în interiorul pădurii. Distanța minimă recomandată între două capcane este de 15 m.

Pentru o atraktivitate corespunzătoare a nadelor, capcanele trebuie verificate săptămânal cu care ocazie se recoltează insectele capturate, care dacă ar ramâne mai mult timp în capcane ar intra în putrefacție, mirosurile astfel rezultate mascând olfactiv nadele feromonale.

## REVENDICARE

Nadă sintetică pentru gândacul de scoarță al molidului, *Ips duplicatus* L., caracterizată prin aceea că folosește ca și atracțant un amestec de substanțe volatile aflate în raportul: 1 Ipsdienol : 1 E-mircenol : 17 Metilbutenol : 0,5 (-) alfa-pinene : 0,5 (+) limonen, care este protejat la oxidare cu BHT (2 g/100 ml), amestec ce este impregnat într-un material (3) celulozic introdus într-un plic (1) de polietilenă LD cu grosimea foliei de 50 µm și cu dimensiunile interne de 50 x 70 mm, plic care este închis prin suduri (2) termice.




Figura 1.